

COLÉOPTÈRES LAMPYRIDES CAPTURÉS À DARDJILLING  
PAR M. LE D<sup>r</sup> HARMAND,

NOMMÉS ET DÉCRITS PAR M. ERNEST OLIVIER.

**Psilocladus Harmandi** nov. sp.

Elongatus, pubescens, piceus; prothorace, scutello et clytris rufo-brunneis; antennis pilosis, articulo 1° apice incrassato, 2° transverso, brevi, 3°-10° bilabellatis, lamellis aequalibus, ciliatis, 11° elongato, gracili; prothorace transverso, antice attenuato et rotundato, basi recte truncato, crebre et rugose punctato, in medio longitudinaliter sulcato; scutello conico, punctato; clytris crebre et rugose punctatis, obsolete tricotulatis. Long. 6 millim.

Étroit, allongé, pubescent; prothorax, écusson et élytres d'un roux rembruni, le reste du corps d'un brun de poix. Le prothorax, transversal, est légèrement atténué en avant avec les angles arrondis; la base est tronquée carrément avec les angles peu saillants; il est fortement ponctué-rugueux et creusé dans son milieu d'un sillon longitudinal; les élytres, fortement rugueuses, sont chargées de trois côtes obsolètes.

C'est la seconde espèce de *Psilocladus* (Voir *Bull. Mus. Hist. nat.*, 1902, p. 188) que M. le D<sup>r</sup> Harmand a rapportée de l'Asie orientale, et je suis heureux de la dédier à l'habile explorateur. Les autres représentants de ce genre, au nombre de dix-sept, proviennent toutes de l'Amérique centrale ou méridionale, et il est curieux d'en trouver de provenance japonaise.

**Luciola nitescens** nov. sp.

Oblonga, aurantiaca, capite, antennis, tibiis, tarsis et clytris, angusta basali fascia execta, nigris; prothorace convexo, transverso, antice attenuato, punctato, in medio longitudinaliter sulcato, angulis posticis obtusis sed valde retro productis, margine antico erecto; scutello punctato, conico, apice truncato; clytris oblongis, rugose punctatis, obsolete 4-costatis, pubescentibus, nigris, basi anguste aurantiacis; duobus ultimis ventris segmentis cereis, ultimo triangulariter attenuato et apice obtuso. Long. 12-13 millim.

D'un jaune orangé, à l'exception de la tête, des antennes, des tibiais, des tarse et des élytres qui sont noirs, ces derniers ayant toutefois le calus huméral et une étroite bande basilaire orangés; tout couvert d'une courte pubescence dorée; prothorax court, transversal, atténué en avant, à angles antérieurs arrondis, marge redressée au-dessus des yeux, à angles postérieurs obtus, mais assez saillants en arrière; écusson conique, à sommet tronqué; élytres ponctué, à points non confluent, à marge externe légèrement relevée, chargés de 4 côtes obsolètes, noirs, sauf une étroite bande basilaire orangée qui part de l'écusson, couvre le calus et tout l'angle hu-

méral; la suture est aussi très finement bordée d'orangé; les deux derniers segments du ventre sont d'un orangé plus clair que les autres; le dernier est terminé en triangle, à sommet arrondi.

---

ANTHICIDES NOUVEAUX DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS [COL.],

PAR M. MAURICE PIC.

**Tomoderus latipennis.**

Oblongo-ovatus, convexus, rufus, nitidus, luteo-pilosus, oculis nigris; capite postice arcuato; thorace medio fortiter strangulato, antice subangulato-dilatato; elytris sat fortiter sat dense punctatis, haud impressis, humeris prominulis sed rotundatis.

Oblong-ovalaire, convexe, orné de poils jaunâtres espacés et un peu soulevés, roux brillant, avec les yeux noirs. Tête large, arquée derrière les yeux; antennes moyennes, entièrement testacées, à 4 derniers articles distinctement épaissis, le précédent un peu moins; prothorax assez long, fortement étranglé au milieu, non sillonné longitudinalement, à lobe antérieur très fortement et presque anguleusement dilaté, le lobe postérieur élargi en arrière; élytres assez longs, subovales, à épaules marquées, mais arrondies, faiblement élargis vers leur milieu, subarrondis au sommet, à ponctuation assez forte et assez rapprochée antérieurement, celle-ci s'effaçant postérieurement; pattes testacées, courtes, à cuisses un peu épaissies. Long., 3.5 millimètres environ.

Soudan français: Kayes (G. Massiou, 1899).

Diffère de *nitidus* Pic par la tête arquée et non tronquée en arrière, le prothorax à lobe antérieur très dilaté, les élytres plus larges; de *ovipennis* Fairm., par la coloration plus claire, la forme plus robuste, les élytres un peu moins diminués antérieurement. Par sa tête arquée derrière les yeux, il se distinguera facilement, et à première vue, de la plupart des espèces du genre.

**Leptaleus Geayi.**

Satis elongatus, nitidus, hirsutopilosus, rufus, elytris obscuris, flavido fasciatis et limbatis; capite fere truncato; thorace elongato ante basin distincte strangulato, antice dilatato subrotundato; elytris subparallelis, fortiter et sparse punctatis, modice impressis, ante et post medium flavido fasciatis, fascia postica modice obliqua.

Assez allongé, brillant avec quelques poils dressés, roux, élytres obscurcis ornés de deux fascies flaves, flaves également sur le pourtour. Tête longue, presque carrée, un peu tronquée en arrière; yeux gris; antennes